

FUNGICIDAI BASTUTINIŲ ŠEIMOS DARŽOVĖMS

Augalų apsaugos produkto pavadinimas	Veiklioji medžiaga, kiekis	Naudojimo norma l, kg/ha	Ligos Daržovės	Apdorojimo laikas, būdai	* Paskutinis apdorojimo terminas iki derliaus nuėmimo dienomis (NKP sistema)	Didžiausias apdorojimų skaičius
Amistar 250 SC Mirador 250 SC	<i>azoksistrobinas</i> 250 g/l	0,8	Juodoji dėmėtligė (alternariozė). Žiediniai, gūžiniai kopūstai, brokoliai	Purkšti pasirodžius pirmiesiems ligos požymiams, nuo 6-ojo lapo iki pasiekiamas būdingos gūžės (žiedyno) dydis (BBCH 16-49)	14 (21)	1
Ataka NT, Dithane NT	<i>mankocebas</i> 750 g/kg	2,0	Netikroji miltligė, alternariozė. Žiediniai kopūstai, brokoliai	Purškama vegetacijos metu	30 (45)	4
Difcor 250 EC	<i>difenokonazol</i> 250 g/l	0,5	Alternariozė (<i>Alternaria</i> spp.). Brokoliai, gūžiniai kopūstai, briuseliniai kopūstai	Purkšti vegetacijos metu, pasirodžius pirmiesiems ligos požymiams nuo gūžės vystymosi iki visiškos brandos (BBCH 40-89)	14 (21)	1
Infinito SC 687,5	<i>propamokarbo hidrochloridas</i> 625 g/l + <i>fluopikolidas</i> 62,5 g/l	1,6	Netikroji miltligė. Gūžiniai, žiediniai, briuseliniai kopūstai, brokoliai	Purškama vegetacijos metu	14 (21)	3
Previcur Energy	<i>prapomokarbas</i> 530 g/l + <i>fosetilas</i> 310 g/l	1,25% (250 ml/20 l vandens 1 m ³ substrato)	Pašaknio ir šaknų puviniai (<i>Fusarium</i> , <i>Pythium</i> , <i>Rhizoctonia</i> , <i>Phoma</i> , <i>Phytophthora</i> , <i>Alternaria</i> genčių rūšys). Substratas daigams.	Laistoma vegetacijos metu		1
		0,15% (15/10 l vandens)	Pašaknio ir šaknų puvinų sukėlėjai (<i>Pythium</i> , <i>Rhizoctonia</i> ,	Laistoma vegetacijos metu		2

Augalų apsaugos produkto pavadinimas	Veiklioji medžiaga, kiekis	Naudojimo norma l, kg/ha	Ligos Daržovės	Apdorojimo laikas, būdai	* Paskutinis apdorojimo terminas iki derliaus nuėmimo dienomis (NKP sistema)	Didžiausias apdorojimų skaičius
			<i>Phytophthora</i> genčių rūšys). Gūžinių ir žiedinių brokolių, briuselinių kopūstų daigai			
Signum	<i>boskalidas</i> 267 g/kg + <i>piraklostrobinas</i> 67 g/kg	1,0	Alternariozė, baltosios rūdys. Žiediniai, briuseliniai kopūstai, brokoliai	Purškama vegetacijos metu	14 (21)	2
Serenade Aso	Bacillus subtilis QST 713 g/l	8,0	Sausligė, pilkasis puvinys, miltligė, juodasis puvinys. Brokoliai, briuseliniai, žiediniai, kininiai kopūstai, auginami lauke	Puršksti vegetacijos metu ne daugiau kaip 6 kartus		6
		1 proc. tirpalas	Diegavirtė.	Laistyti dirvą prieš persodinant daigus ne daugiau kaip 1 kartą.		1
		10 l/ha		Laistyti aplink daigo šaknis ne daugiau kaip 1 kartą.		1

* Auginant pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto kokybės sistemą (NKP) paskutinis apdorojimo terminas iki derliaus nuėmimo (dienomis) ilginamas 1,5 karto (pvz. 14 x 1,5 = 21)

Dezinfekcijos priemonės

Menno Florades	* <i>benzoinė rūgštis</i> 90 g/l	Paviršių, vazonėlių šiltnamiuose dezinfekcijai	Virusai	Dezinfekuojama 1–4% tirpalu / 16 valandų
			Bakterijos, grybai	Dezinfekuojama 1% tirpalu / 16 valandų
		Peilių, įrangos, naudojamų šiltnamiuose, dezinfekcijai	Virusai	Dezinfekuojama 2–3% tirpalu / 3 minutes
			Bakterijos, grybai, viroidai	Dezinfekuojama 1% tirpalu / 3 minutes

* Gali pagreitinti metalų koroziją